

## 「藥品給付規定」修訂對照表

## 第11 節解毒劑 Antidotes in poisoning

(自107年11月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p><u>11.2.5.Fomepizole (如 Fomeject) : (107/11/1)</u></p> <p><u>1. 限下列病例使用：</u></p> <p><u>(1) 甲醇中毒：</u></p> <p><u>I. 確認甲醇服用病史。</u></p> <p><u>II. 血中甲醇濃度 &gt;20mg/dL。</u></p> <p><u>III. 食入已達中毒劑量的甲醇且 osmolal gap (OG) &gt;10mOsm/L。</u></p> <p><u>IV. 臨床高度懷疑為甲醇中毒且下面三項指標中至少符合兩項：</u></p> <p><u>i. 血液 pH &lt;7.3；</u></p> <p><u>ii. 血中 bicarbonate &lt;20meq/L；</u></p> <p><u>iii. Osmolal gap (OG) &gt;10mOsm/L。</u></p> <p><u>(2) 乙二醇中毒：</u></p> <p><u>I. 確認乙二醇服用病史。</u></p> <p><u>II. 血中乙二醇濃度 &gt;20mg/dL。</u></p> <p><u>III. 食入已達中毒劑量的乙二醇且 osmolal gap (OG) &gt;10mOsm/L。</u></p> <p><u>IV. 臨床高度懷疑食入乙二醇且造成下列四項表徵中之三項：</u></p> <p><u>i. 血液 pH &lt;7.3；</u></p> <p><u>ii. 血中 bicarbonate &lt;20meq/L；</u></p> <p><u>iii. Osmolal gap (OG) &gt;10mOsm/L；</u></p> <p><u>iv. 尿液檢查結果有草酸結晶。</u></p> <p><u>(3) 上述檢驗資料應於病歷詳細記載。</u></p> <p><u>2. 需排除或停止使用之情形如下：</u></p>	(無)

<p><u>(1)血中甲醇或乙二醇濃度濃度低於20mg/dL；</u></p> <p><u>(2)已知對 fomepizole 或其他 pyrazoles 過敏。</u></p>	
---	--

備註：劃線部分為新修訂規定