

「藥品給付規定」修訂對照表

第1節 神經系統藥物 Drugs acting on the nervous system

(自108年5月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>1.3.3. 失智症治療藥品</p> <p>1.~3. (略)</p> <p>4. 依疾病別及嚴重度，另規定如下：</p> <p>(1)阿滋海默氏症之失智症由神經科或精神科醫師處方使用。</p> <p>I. 輕度至中度失智症：</p> <p>限使用 donepezil、rivastigmine 及 galantamine 口服製劑 (90/10/1、92/1/1、95/6/1、100/3/1、102/8/1、106/10/1、<u>108/5/1</u>)：</p> <p>i. 智能測驗結果為 MMSE 10~26分或 CDR 1級及2級之患者。</p> <p>ii. 使用前述三種藥品任一種後，三個月內，因副作用得換用本類另一種藥物，並於病歷上記載換藥理由。(93/4/1、102/8/1、106/10/1)</p> <p>iii. 使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗，並於病歷記錄，如 MMSE 較前一次治療時減少2分(不含)以上或 CDR 退步1級，則應停用此類藥品。(98/1/1、99/5/1、102/8/1、106/10/1、<u>108/5/1</u>)</p>	<p>1.3.3. 失智症治療藥品</p> <p>1.~3. (略)</p> <p>4. 依疾病別及嚴重度，另規定如下：</p> <p>(1)阿滋海默氏症之失智症由神經科或精神科醫師處方使用。</p> <p>I. 輕度至中度失智症：</p> <p>限使用 donepezil、rivastigmine 及 galantamine 口服製劑 (90/10/1、92/1/1、95/6/1、100/3/1、102/8/1、106/10/1)：</p> <p>i. 智能測驗結果為 MMSE 10~26分或 CDR 1級及2級之患者。</p> <p>ii. 使用前述三種藥品任一種後，三個月內，因副作用得換用本類另一種藥物，並於病歷上記載換藥理由。(93/4/1、102/8/1、106/10/1)</p> <p>iii. 使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗，並於病歷記錄，如 MMSE 較前一次治療時減少2分(不含)以上或 CDR 退步1級，則應停用此類藥品。 <u>惟 Epalon Tablets、NEPES Tablets、Nomi-Nox Tablets 等3種藥品，使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗，並於病歷記錄，如 MMSE</u></p>

<p>iv. (略)</p> <p>II. 中重度失智症： 限使用 memantine 口服製劑(略)</p> <p>III. 重度失智症：(99/10/1、 102/8/1、<u>108/5/1</u>) 限使用 donepezil 及 memantine 口 服製劑 (102/8/1、<u>108/5/1</u>)</p> <p>i. 智能測驗結果為 MMSE 5-9分且 CDR 3級之患者。</p> <p>ii. 臥床或無行動能力者不得使用。</p> <p>iii. 曾使用過 memantine, donepezil, rivastigmine, galantamine 而 不再適用者，不得使用。</p> <p>iv. donepezil 及 memantine 二者不 能併用。</p> <p>v. 使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 智能測驗，如 MMSE 較前一次 治療時減少2分(不含)以上，則應 停用此類藥品。惟 Ebixa Tablets 及 Evy Tablets 等2種藥品，使用 後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 智能測驗，如 MMSE 較起步治療時 減少2分(不含)以上，則應停用此 類藥品。(99/10/1、102/8/1、 <u>108/5/1</u>)</p> <p>(2) 帕金森氏症之失智症(略)</p>	<p><u>較起步治療時減少2分(不含)以 上或 CDR 退步1級，則應停用此 類藥品。</u> (98/1/1、99/5/1、 102/8/1、106/10/1)</p> <p>iv. (略)</p> <p>II. 中重度失智症： 限使用 memantine 口服製劑(略)</p> <p>III. 重度失智症：(99/10/1、 102/8/1) 限使用 donepezil 及 memantine 口 服製劑 (102/8/1)</p> <p>i. 智能測驗結果為 MMSE 5-9分且 CDR 3級之患者。</p> <p>ii. 臥床或無行動能力者不得使用。</p> <p>iii. 曾使用過 memantine, donepezil, rivastigmine, galantamine 而不再適用者，不得使用。</p> <p>iv. donepezil 及 memantine 二者不 能併用。</p> <p>v. 使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 智能測驗，如 MMSE 較前一 次治療時減少2分(不含)以上，則 應停用此類藥品。惟 <u>Epalon</u> <u>Tablets</u>、<u>NEPES Tablets</u>、<u>Nomi-</u> <u>Nox Tablets</u>、<u>Ebixa Tablets</u> 及 <u>Evy Tablets</u> 等5種藥品，使用後 每一年需重新評估，追蹤 MMSE 智 能測驗，如 MMSE 較起步治療時減 少2分(不含)以上，則應停用此類 藥品。(99/10/1、102/8/1)</p> <p>(2) 帕金森氏症之失智症(略)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

備註：起步治療定義：係指同組藥品第一次申請同意治療之評分

備註：起步治療定義：係指同組藥品第一次申請同意治療之評分

備註：劃線部份為新修訂之規定。

