

「藥品給付規定」修訂規定

第10節 抗微生物劑 Antimicrobial agents

(自108年5月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>10.7.3.Lamivudine 100mg(如 Zeffix) ; entecavir (如 Baraclude) ; telbivudine (如 Sebivo) ; tenofovir <u>disoproxil</u> (如 Viread) ; <u>tenofovir alafenamide</u> (如 Vemlidy) : (92/10/1、93/2/1、93/8/1、94/10/1、95/10/1、95/11/1、97/8/1、98/11/1、99/5/1、99/7/1、100/6/1、102/2/1、104/12/1、106/1/1、106/4/1、107/2/1、108/2/1、<u>108/5/1</u>)</p> <p>限用於參加「全民健康保險加強慢性B型及C型肝炎治療計畫」之下列慢性病毒性B型肝炎患者：</p> <p>1. HBsAg(+)且已發生肝代償不全者，以 lamivudine 100mg、entecavir 1.0mg、telbivudine、或 tenofovir <u>disoproxil</u> 治療，其給付療程如下：(98/11/1、100/6/1、102/2/1、104/12/1、106/1/1、106/4/1、<u>108/5/1</u>)</p> <p>(1)HBeAg 陽性病患治療至 e 抗原轉陰 並再給付最多12個月治療。</p> <p>(2)HBeAg 陰性病患治療至少二年，治</p>	<p>10.7.3.Lamivudine 100mg(如 Zeffix) ; entecavir (如 Baraclude) ; telbivudine <u>600mg</u> (如 Sebivo) ; tenofovir <u>300mg</u> (如 Viread) : (92/10/1、93/2/1、93/8/1、94/10/1、95/10/1、95/11/1、97/8/1、98/11/1、99/5/1、99/7/1、100/6/1、102/2/1、104/12/1、106/1/1、106/4/1、107/2/1、108/2/1)</p> <p>限用於參加「全民健康保險加強慢性B型及C型肝炎治療計畫」之下列慢性病毒性B型肝炎患者：</p> <p>1. HBsAg(+)且已發生肝代償不全者，以 lamivudine 100mg、entecavir 1.0mg、telbivudine <u>600mg</u>、或 tenofovir <u>300mg</u> 治療，其給付療程如下：(98/11/1、100/6/1、102/2/1、104/12/1、106/1/1、106/4/1)</p> <p>(1)HBeAg 陽性病患治療至 e 抗原轉陰 並再給付最多12個月治療。</p> <p>(2)HBeAg 陰性病患治療至少二年，治療期間需檢驗血清 HBV DNA，並於</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>療期間需檢驗血清 HBV DNA，並於檢驗血清 HBV DNA 連續三次，每次間隔6個月，均檢驗不出 HBV DNA 時停藥，每次療程至多給付36個月。</p> <p>註：</p> <p>I. 肝代償不全條件為 prothrombin time 延長\geq3秒或 bilirubin (total)\geq2.0mg/dL，prothrombin time 延長係以該次檢驗 control 值為準。</p> <p>II. Entecavir 每日限使用1粒。</p> <p>2. 慢性 B 型肝炎病毒帶原者 HBsAg(+)：(98/11/1) (1)~(6)(略) (7)血清 HBV DNA\geq 10⁶ IU/mL 之懷孕者，可於懷孕滿27週後開始給付使用 telbivudine 或 tenofovir <u>disoproxil</u>，直至產後4週。 (107/2/1、108/5/1) (8)(略)</p> <p>3. ~7. (略)</p> <p>10.7.4. Adefovir dipivoxil (如 Hepsara Tablets 10mg)；Entecavir (如 Baraclude 1.0mg)；tenofovir <u>disoproxil</u> (如 Viread)；tenofovir <u>alafenamide</u> (如 Vemlidy)：(95/9/1、95/10/1、97/8/1、</p>	<p>檢驗血清 HBV DNA 連續三次，每次間隔6個月，均檢驗不出 HBV DNA 時停藥，每次療程至多給付36個月。</p> <p>註：</p> <p>I. 肝代償不全條件為 prothrombin time 延長\geq3秒或 bilirubin (total)\geq2.0mg/dL，prothrombin time 延長係以該次檢驗 control 值為準。</p> <p>II. Entecavir 每日限使用1粒。</p> <p>2. 慢性 B 型肝炎病毒帶原者 HBsAg(+)：(98/11/1) (1)~(6)(略) (7)血清 HBV DNA\geq 10⁶ IU/mL 之懷孕者，可於懷孕滿27週後開始給付使用 telbivudine 或 tenofovir，直至產後4週。(107/2/1) (8)(略)</p> <p>3. ~7. (略)</p> <p>10.7.4. Adefovir dipivoxil (如 Hepsara Tablets 10mg)；Entecavir (如 Baraclude 1.0mg)；tenofovir <u>300mg</u> (如 Viread)：(95/9/1、95/10/1、97/8/1、98/11/1、99/5/1、99/7/1、102/2/1、104/12/1、106/1/1、106/4/1)</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>98/11/1、99/5/1、99/7/1、 102/2/1、104/12/1、106/1/1、 106/4/1、<u>108/5/1</u>)</p> <p>限用於參加「全民健康保險加強慢性 B型及C型肝炎治療計畫」之下列慢 性病毒性B型肝炎患者：</p> <p>1. 經使用 lamivudine 100mg、 entecavir 0.5mg 或1.0mg、 telbivudine 治療或預防B型肝炎發 作出現抗藥株(指於治療中一旦HBV DNA從治療期間之最低值上升超過一 個對數值(1 log IU/mL)，以下條件 擇一給付：(98/11/1、99/5/1、 102/2/1、104/12/1、106/4/1) (1)~(3)(略) (4)改用 tenofovir <u>disoproxil</u> 或 <u>tenofovir alafenamide</u> 單一藥物 治療。(104/12/1、106/4/1、 <u>108/5/1</u>) (5)原已接受其他口服抗病毒藥物救援 治療，治療期間出現抗藥株，或治 療未達預期之病毒學反應，得改以 tenofovir <u>disoproxil</u> 或 <u>tenofovir alafenamide</u> 單一藥物 救援治療。(104/12/1、106/4/1、 <u>108/5/1</u>)</p> <p>2. 若停藥後復發，得以合併療法，<u>或</u> tenofovir <u>disoproxil</u> 或 tenofovir <u>alafenamide</u> 單一藥物再治療，或以</p>	<p>限用於參加「全民健康保險加強慢性 B型及C型肝炎治療計畫」之下列慢 性病毒性B型肝炎患者：</p> <p>1. 經使用 lamivudine 100mg、 entecavir 0.5mg 或1.0mg、 telbivudine 治療或預防B型肝炎發 作出現抗藥株(指於治療中一旦HBV DNA從治療期間之最低值上升超過一 個對數值(1 log IU/mL)，以下條件 擇一給付：(98/11/1、99/5/1、 102/2/1、104/12/1、106/4/1) (1)~(3)(略) (4)改用 tenofovir <u>300mg</u> 單一藥物治 療。(104/12/1、106/4/1) (5)原已接受其他口服抗病毒藥物救援 治療，治療期間出現抗藥株，或治 療未達預期之病毒學反應，得改以 tenofovir 單一藥物救援治療。 (104/12/1、106/4/1)</p> <p>2. 若停藥後復發，得以合併療法或 tenofovir 單一藥物再治療，或以干 擾素再治療1年。(99/7/1、 104/12/1、106/1/1、106/4/1)</p> <p>3. 慢性B型肝炎表面抗原(HBsAg)帶</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>干擾素再治療1年。(99/7/1、104/12/1、106/1/1、106/4/1、<u>108/5/1</u>)</p> <p>3. 慢性 B 型肝炎表面抗原 (HBsAg) 帶原者：(略)</p> <p>4. 臨床上若產生多重抗藥病毒株時可給予 <u>tenofovir disoproxil</u> 或 <u>tenofovir alafenamide</u> 單一藥物治療，或合併 entecavir 1.0mg 及 <u>tenofovir disoproxil</u> 治療，<u>或合併 entecavir 1.0mg 及 tenofovir alafenamide</u> 治療。(104/12/1、106/4/1、<u>108/5/1</u>)</p> <p>註：多重抗藥病毒株指病毒對 lamivudine、telbivudine、entecavir 或 adefovir 產生二種 (含)藥物以上之抗藥性。 (104/12/1)</p> <p>5. (略)</p>	<p>原者：(略)</p> <p>4. 臨床上若產生多重抗藥病毒株時可給予 <u>tenofovir 300mg</u> 單一藥物治療，或合併 entecavir 1.0mg 及 <u>tenofovir 300mg</u> 治療。 (104/12/1、106/4/1)</p> <p>註：多重抗藥病毒株指病毒對 lamivudine、telbivudine、entecavir 或 adefovir 產生二種 (含)藥物以上之抗藥性。 (104/12/1)</p> <p>5. (略)</p>

備註：劃線部份為新修訂之規定。