

「藥品給付規定」修訂對照表

第 3 節 代謝及營養劑 Metabolic & nutrient agents

(自 108 年 8 月 1 日生效)

修正後給付規定	原給付規定
<p>3.3.6. "Baxter" Extraneal Peritoneal Dialysis Solution With 7.5% Icodextrin (93/12 /1、96/1/1、99/9/1、100/2/1、<u>108/8/1</u>)</p> <p>1. 限下列病患使用：</p> <p>(1)high transporters 病患，用於每天長留置期。(100/2/1)</p> <p>(2)<u>high average transporters 病患，每天使用 1 袋\geq2.5%葡萄糖腹膜透析液。(108/8/1)</u></p> <p>(3)<u>脫水衰竭病患及臨界脫水衰竭邊緣之病患，即病患下列情形之一者：</u></p> <p>I. 使用 4.25%傳統式葡萄糖腹膜透析液 4 小時內脫水量小於等於 400cc. 者。</p> <p>II. 每天使用總袋數 1/2 以上(含) \geq2.5%葡萄糖腹膜透析液。<u>(108/8/1)</u></p>	<p>3.3.6. "Baxter" Extraneal Peritoneal Dialysis Solution With 7.5% Icodextrin (93/12 /1、96/1/1、99/9/1、100/2/1)</p> <p>1. 限下列病患使用：</p> <p>(1)high transporters 病患，用於每天長留置期。(100/2/1)</p> <p>(2)<u>脫水衰竭病患及臨界脫水衰竭邊緣之病患，即病患：</u></p> <p>I. 使用 4.25%傳統式葡萄糖腹膜透析液 4 小時內脫水量小於等於 400cc. 者<u>或；</u></p> <p>II. 每天使用總袋數 1/2 以上 (含) 2.5 % <u>或 4.25%</u> 葡萄糖腹膜透析液。</p> <p>III. <u>體重 20 公斤以下之兒童，脫水困難或會倒吸者，每天使用 3 袋(含)2.5% 或 4.25% 葡萄糖腹膜透析液。</u></p>

<p>(4)HbA1c 大於 7.0%的糖尿病腹膜透析病患，用於每天長留置期。</p> <p>(5)腹膜炎病患。</p> <p>2. 每天限用一袋。</p> <p>3. 申報時，應檢附最近 <u>1</u> 個月內，殘餘尿量與每日脫水量之相關文件，以及使用 Extraneal solution 前，每日脫水量等相關資料，供審查參考。(99/9/1、<u>108/8/1</u>)</p>	<p><u>IV.</u> 申報時，應檢附最近 <u>3</u> 個月內，殘餘尿量與每日脫水量之相關文件，以及使用 Extraneal solution 前，每日脫水量之相關資料，供審查參考。(99/9/1)</p> <p>(3)HbA1c 大於 7.0 % 的糖尿病腹膜透析病患，用於每天長留置期。</p> <p>(4)腹膜炎病患。</p> <p>2. 每天限用一袋。</p>
--	---

備註：劃線部分為新修訂規定。