

「藥品給付規定」修訂對照表

第 2 節 心臟血管及腎臟藥物 Cardiovascular-renal drugs

(自 109 年 6 月 1 日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>2.14. Sacubitril+Valsartan (如 Entresto)：(106/3/1、109/6/1)</p> <p>1. 限符合下列各項條件之慢性收縮性心衰竭患者使用：</p> <p>(1) 依紐約心臟協會(NYHA)心衰竭功能分級為第二級至第四級。左心室收縮功能不全，左心室射出分率(LVEF) $\leq 35\%$ (<u>初次使用者須檢附半年內心臟超音波、心導管左心室造影、核醫、電腦斷層或磁振造影等標準心臟功能檢查的左心室射出分率數值結果為參考依據；如果是急性心肌梗塞、急性心肌炎或初次裝置左心室再同步心律調節器或左心室再同步去顫復律器者，須經治療至少 3 個月並附上往後半年內之之心臟超音波、心導管左心室造影、核醫、電腦斷層或磁振造影等標準心臟功能檢查的左心室射出分率數值結果為參考依據</u>)。</p> <p>(2) 經 ACEI 或 ARB <u>穩定劑量治療</u>，及合併使用 β-阻斷劑<u>最大可耐受劑量</u>已達 4 週(含)以上或<u>使用 β-阻斷劑有禁忌症而無法使用</u>，仍有心衰竭症狀者。</p> <p>2. <u>不應與 ACEI 或 ARB 合併使用</u>，開始使用本藥，至少要和 ACEI 間隔 36 小時。</p> <p>3. <u>曾有血管性水腫(angioedema)病史</u></p>	<p>2.14. Sacubitril+Valsartan (如 Entresto)：(106/3/1)</p> <p>1. 限符合下列各項條件之慢性心衰竭患者使用：</p> <p>(1) 依紐約心臟協會(NYHA)衰竭功能分級為第二級或第三級。左心室收縮功能不全，左心室射出分率(LVEF) $\leq 35\%$。</p> <p>(2) 經 ACEI 或 ARB，及合併 β-阻斷劑穩定劑量治療達 4 週以上，仍有症狀者。</p> <p>2. 每日限最多使用 2 粒。</p> <p>3. 不應與 ACEI 合併使用，開始使用本藥，至少要和 ACEI 間隔 36 小時。曾有血管性水腫(angioedema)病史者，禁止</p>

者，禁止使用。 4. 每日限最多使用 2 粒。	使用。
----------------------------	-----

備註：劃線部分為新修訂規定