

含 donepezil 成分藥品中文仿單修訂內容

➤ 警語及注意事項（應包含下列敘述）：

曾有使用 donepezil 後發生 QT 間期延長和多型性心室頻脈 (Torsade de Pointes) 之上市後通報案例，因此於高風險病人族群（包含有 QT 間期延長之病史或家族史，正使用其它會影響 QT 間期之藥品，有心衰竭、近期心肌梗塞、心搏過緩等心臟疾病病史，有低血鉀與低血鎂等電解質不平衡之病人）使用此藥品須特別留意，可能須進行心電圖等臨床監測。

➤ 交互作用（應包含下列敘述）：

併用 donepezil 與其他亦會影響 QT 間期之藥品時，須特別留意並且可能需要監測心電圖，影響 QT 間期之藥品舉例如下：

- Class IA 心律不整藥品(如 quinidine)。
- Class III 心律不整藥品(如 amiodarone、sotalol)。
- 部分抗憂鬱藥品(如 citalopram、escitalopram、amitriptyline)。
- 部分抗精神疾病藥品(如 phenothiazine derivatives、sertindole、pimozide、ziprasidone)。
- 部分抗生素藥品(如 clarithromycin、erythromycin、levofloxacin、moxifloxacin)。

➤ 副作用/不良反應（應包含下列敘述）：

上市後經驗： QT 間期延長及多型性心室頻脈(Torsade de Pointes)。