

鼓勵業者申請藥品許可證之清單

| 項次 | 成分  | 劑型       | 曾核准之適應症   |
|----|---|----------|---|
| 1  | Interferon alpha-2a                               | 注射劑型     | 多毛狀細胞白血球過多病(HAIRY CELL LEUKEMIA)，卡波西氏肉瘤(KAPOSI'S SARCOMA)對活性慢性B型肝炎(CHRONIC ACTIVE HEPATITIS B)可能有效，慢性骨髓白血病(CML)，皮膚T細胞淋巴瘤(CTCL)，慢性C型肝炎 |
| 2  | D-Penicillamine                                   | 口服劑型     | 類風濕關節炎、重金屬中毒  |
| 3  | Technetium Tc 99m Radiopharmaceutical DTPA kit    | 注射劑型     | 腎疾患之放射造影  |
| 4  | Technetium Tc 99m Radiopharmaceutical DMSA kit    | 注射劑型     | 腎疾患之造影檢查  |
| 5  | Technetium Tc 99m Radiopharmaceutical PYP kit     | 注射劑型     | 骨骼及心臟疾患放射造影   |
| 6  | Technetium Tc 99m Radiopharmaceutical phytate kit | 注射劑型     | 肝脾疾患之放射造影   |
| 7  | Iodomethyl-norcholestenol I131                    | 注射劑型     | 副腎疾患之放射造影   |
| 8  | 具大腸攝影檢查適應症之 Barium sulfate                        | 口服劑型     | 直腸疾患之X線造影劑  |
| 9  | Desferrioxamine                                   | 注射劑型     | 鐵質沉著症、急性鐵中毒、鋁質沉著症   |
| 10 | Cisatracurium                                     | 注射劑型     | 手術全身麻醉劑之輔助劑或加護病房使用，用以鬆弛骨骼肌，幫助氣管插管及與人工呼吸的協調。   |
| 11 | Atracurium  | 注射劑型     | 手術全身麻醉劑之輔助劑或加護病房使用，用以鬆弛骨骼肌，幫助氣管插管及與人工呼吸的協調。   |
| 12 | Ketamine  | 注射劑型     | 麻醉劑   |
| 13 | Bupivacaine                                       | 非脊椎用注射劑型 | 局部麻醉  |
| 14 | L-asparaginase                                    | 注射劑型     | 急性白血病(包括由慢性白血病轉變成急性者)惡性淋巴瘤  |
| 15 | Minoxidil   | 口服劑型     | 嚴重高血壓   |
| 16 | Vigabatrin  | 口服劑型     | 抗癲癇之輔助療法  |

|    |  |                |   |
|----|--|----------------|---|
| 17 | Adenosine                              | 注射劑型           | 治療陣發性上心室心搏過速、輔助診斷Q R S波變寬或變窄之複雜性上心室心搏過速   |
| 18 | Milrinone                              | 注射劑型           | 充血性心衰竭的短期療法   |
| 19 | Melphalan                              | 口服劑型           | 局部惡性黑色素瘤、軟組織肉瘤、多發性骨髓瘤、卵巢癌、神經母細胞瘤  |
| 20 | Sultamicillin tosilate hydrate         | 口服劑型           | 鏈球菌、葡萄球菌、大腸桿菌、克雷氏菌、沙雷氏菌、流行感冒嗜血桿菌、陰性變形桿菌屬、檸檬酸菌屬及厭氧性細菌(BACTEROIDES FUSOBACTERIUM, CLOSTERIDIUM DIFFICILE)引起之感染症。  |
| 21 | Etomidate                              | 注射劑型           | 靜脈注射麻醉劑   |
| 22 | Cefaclor                               | 口服劑型<br>(兒童)   | 甲族乙型溶血性鏈球菌、葡萄球菌、肺炎雙球菌、大腸桿菌、奇異變形桿菌、克雷氏肺炎桿菌、嗜血桿菌、淋球菌等病原菌所引起之感染。   |
| 23 | Amoxicillin                            | 口服劑型<br>(兒童)   | 葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症  |
| 24 | thiamylal                              | 注射劑型           | 靜脈麻醉、全身麻醉之誘導  |
| 25 | Carbamazepine                          | 口服劑型<br>(緩釋劑型) | 癲癇症、三叉神經痛、腎原性尿崩症、雙極性疾患、原發性舌咽神經痛   |
| 26 | Thiopental或Methohexital                | 注射劑型           | 靜脈麻醉、全身麻醉之誘導  |
| 27 | Flupentixol Decanoate                  | 注射劑型           | 精神病狀態   |
| 28 | Epinephrine                            | 注射筆劑型          | 腎上腺素用於昆蟲叮咬、食物、藥物和其他過敏原以及原發性或運動引起嚴重性過敏反應(anaphylaxis)之緊急治療。具有過敏性反應病史之患者可立即自我使用之藥物，過敏反應可能在幾分鐘內發生一連串的臉紅、憂慮、暈厥、心跳加速、脈搏微弱加上血壓下降、抽搐、嘔吐、腹瀉、腹部絞痛、非自主性排泄、氣喘、咽喉頭痙攣引發之呼吸困難、搔癢、出疹、蕁麻疹、血管性水腫。只用在緊急性支持療法，不能取代後續醫療或醫院照護。 |
| 29 | Betiatide                              | 注射劑型           | 腎功能造影診斷   |
| 30 | Acetylcholine或 Carbachol               | 眼用注射劑型         | 預防白內障手術後24小時內眼內壓之升高，縮瞳劑。(眼內手術需緊急縮瞳時使用)  |
| 31 | Recombinant Factor VIIa (Eptacog Alfa) | 注射劑型           | 1.A型及B型血友病發生抗第八及第九因子抗體者、後天性血友病(發生抗第八型及第九因子抗體者)、缺乏第七因子者、Glanzmanns Thrombasthenia。2.產後嚴重出血：用於子宮收縮劑不足以達到止血效果時的產後嚴重出血。   |
| 32 | Gamma globulin, anti-RHO(D)            | 注射劑型           | 預防因配偶間R H因子不同而導致之流產及初生兒夭折   |