

「藥品給付規定」修訂對照表

第9節 抗癌瘤藥物 Antineoplastics drugs

(自114年12月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
9. 18. Trastuzumab (如Herceptin) : (91/4/1、93/8/1、95/2/1、 99/1/1、99/8/1、99/10/1、 101/1/1、105/11/1、108/5/1、 109/2/1、111/12/1、112/10/1、 113/8/1、113/12/1、114/1/1、 114/5/1、<u>114/12/1</u>) 1. 早期乳癌(99/1/1、99/8/1、 99/10/1、101/1/1、111/12/1、 112/10/1、113/8/1、113/12/1、 114/1/1、<u>114/12/1</u>) (1)外科手術前後、化學療法(術前輔助 治療或輔助治療)治療後，具HER2過 度表現(IHC3+或FISH+)，且具腋下 淋巴結轉移但無遠處臟器轉移之早 期乳癌患者，作為輔助性治療用 藥：(99/8/1、99/10/1、101/1/1、 111/12/1、112/10/1、113/8/1、 113/12/1、114/1/1、<u>114/12/1</u>)。 I. 外科手術後達病理上緩解(pCR)， 下列i.~iii.使用於外科手術前後之 總療程合併計算，依藥品仿單記載 以18個療程為上限：(113/8/1、 113/12/1、114/1/1、<u>114/12/1</u>) i. 本藥品	9. 18. Trastuzumab (如Herceptin) : (91/4/1、93/8/1、95/2/1、 99/1/1、99/8/1、99/10/1、 101/1/1、105/11/1、108/5/1、 109/2/1、111/12/1、112/10/1、 113/8/1、113/12/1、114/1/1、 114/5/1) 1. 早期乳癌(99/1/1、99/8/1、 99/10/1、101/1/1、111/12/1、 112/10/1、113/8/1、113/12/1、 114/1/1) (1)外科手術前後、化學療法(術前輔助 治療或輔助治療)治療後，具HER2過 度表現(IHC3+或FISH+)，且具腋下 淋巴結轉移但無遠處臟器轉移之早 期乳癌患者，作為輔助性治療用 藥：(99/8/1、99/10/1、101/1/1、 111/12/1、112/10/1、113/8/1、 113/12/1、114/1/1)。 I. 外科手術後達病理上緩解(pCR)， 下列i.~iii.使用於外科手術前後之 總療程合併計算，依藥品仿單記載 以18個療程為上限：(113/8/1、 113/12/1、114/1/1) i. 本藥品

修訂後給付規定	原給付規定
ii. pertuzumab與trastuzumab併用 iii. pertuzumab與trastuzumab皮下注射複方製劑(如Phesgo) II. 若外科手術後無法達病理上緩解(non-pCR)，本藥品與trastuzumab emtansine使用於外科手術前後的總療程合併計算，依藥品仿單記載以全部18個療程為上限，其中trastuzumab emtansine以14個療程為上限。(113/8/1、113/12/1) (2)外科手術前後、化學療法(術前輔助治療或輔助治療)治療後，符合下列所有條件之早期乳癌患者： (111/12/1、112/10/1、113/8/1、113/12/1、114/1/1、<u>114/12/1</u>) (略) 2. 轉移性乳癌(略) 3. 轉移性胃癌(略) 4. (略)	ii. pertuzumab與trastuzumab (<u>限使用Ogivri、Herzuma、Eirgasun、Herceptin、Kanjinti</u>) 併用 iii. pertuzumab與trastuzumab皮下注射複方製劑(如Phesgo) II. 若外科手術後無法達病理上緩解(non-pCR)，本藥品與trastuzumab emtansine使用於外科手術前後的總療程合併計算，依藥品仿單記載以全部18個療程為上限，其中trastuzumab emtansine以14個療程為上限。(113/8/1、113/12/1) (2)外科手術前後、化學療法(術前輔助治療或輔助治療)治療後，符合下列所有條件之早期乳癌患者(<u>限使用Ogivri、Herzuma、Eirgasun、Herceptin、Kanjinti</u>)： (111/12/1、112/10/1、113/8/1、113/12/1、114/1/1) (略) 2. 轉移性乳癌(略) 3. 轉移性胃癌(略) 4. (略)
9. 70. Pertuzumab(如 Perjeta)： (108/5/1、108/12/1、112/8/1、113/12/1、114/1/1、114/5/1、<u>114/12/1</u>) 1. 本藥品與 trastuzumab 及化學療法併	9. 70. Pertuzumab(如 Perjeta)： (108/5/1、108/12/1、112/8/1、113/12/1、114/1/1、114/5/1) 1. 本藥品與 trastuzumab (<u>限使用</u>

修訂後給付規定	原給付規定
用於具 HER2過度表現 (IHC3+或 FISH+)，且具腋下淋巴結轉移但無遠處臟器轉移之早期乳癌病人 (113/12/1、114/1/1、114/5/1、<u>114/12/1</u>) (1)使用於術前輔助治療，經外科手術後達病理上完全緩解者 (pCR)，得繼續使用至18個療程為上限。 (2)若未接受術前輔助治療，即先行手術者，可給予術後輔助治療，以18個療程為使用上限。 (3)下列 I ~ III 使用於外科手術前後之總療程合併計算，依藥品仿單記載以18個療程為上限： I：pertuzumab 與 trastuzumab 併用 II：trastuzumab III：pertuzumab 與 trastuzumab 皮下注射複方製劑(如 Phesgo) (4)須經事前審查核准後使用，核准後每24週須檢附療效評估資料再次申請，若疾病有惡化情形即不應再行申請。(113/12/1、114/5/1) 2. 轉移性乳癌(108/5/1、108/12/1、112/8/1、113/12/1)(略)	<u>Ogivri、Herzuma、Eirgasun、Herceptin、Kanjinti</u>) 及化學療法併用於具 HER2過度表現 (IHC3+或 FISH+)，且具腋下淋巴結轉移但無遠處臟器轉移之早期乳癌病人 (113/12/1、114/1/1、114/5/1) (1)使用於術前輔助治療，經外科手術後達病理上完全緩解者 (pCR)，得繼續使用至18個療程為上限。 (2)若未接受術前輔助治療，即先行手術者，可給予術後輔助治療，以18個療程為使用上限。 (3)下列 I ~ III 使用於外科手術前後之總療程合併計算，依藥品仿單記載以18個療程為上限： I：pertuzumab 與 trastuzumab 併用 II：trastuzumab III：pertuzumab 與 trastuzumab 皮下注射複方製劑(如 Phesgo) (4)須經事前審查核准後使用，核准後每24週須檢附療效評估資料再次申請，若疾病有惡化情形即不應再行申請。(113/12/1、114/5/1) 2. 轉移性乳癌(108/5/1、108/12/1、112/8/1、113/12/1)(略)

備註:劃線部分為新修訂規定