

「藥品給付規定」修訂對照表

第2節 心臟血管及腎臟藥物 Cardiovascular-renal drugs

(自115年4月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>2.19. Mavacamten (如 Camzyos) : (115/4/1)</p> <p>1. 限用於治療症狀性紐約心臟學會 (NYHA) 分級第二級及第三級阻塞型肥厚性心肌病變(HCM)之18歲以上成人病人，用以改善功能容量與症狀。病人須符合以下條件：</p> <p>(1)左心室壁厚度(left ventricular wall thickness)≥15mm(具有HCM家族史者則≥13mm)。</p> <p>(2)經心臟超音波檢測之靜止時、伐式操作(Valsalva maneuver)或運動後之LVOT壓力差≥50mmHg且LVEF≥55%。</p> <p>(3)曾接受過乙型阻斷劑或鈣離子阻斷劑 (verapamil 或 diltiazem) 治療並已達最大LVOT壓力差下降效果的劑量後，在治療期間仍無法控制LVOT壓力差；但具禁忌症或無法耐受者不在此限。</p> <p>2. 須經事前審查核准後使用，第一次申請以6個月為限，期滿需經再次申請核准後使用，每次續用申請以12個月為限。</p> <p>3. 續用條件：使用藥物治療達6個月以上，LVEF≥55%，並且靜止時、伐式操作(Valsalva maneuver)或運動後之 LVOT 壓力差&lt;50mmHg 或治療前後 LVOT 壓力差下降幅度達20mmHg。</p>	<p>(無)</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p><u>4. 停藥條件：</u></p> <p><u>(1)當 LVEF&lt;50%時應中斷治療，每4週再次確認心臟超音波參數，直到 LVEF≥50%為止，並依仿單用法重啟治療。</u></p> <p><u>(2)當每日劑量2.5mg 時，發生2次 LVEF&lt;50%或1次 LVEF≤30%時，須永久停藥。</u></p> <p><u>5. 限心臟專科醫師處方。</u></p> <p><u>6. Camzyos 2.5mg 每日至多給付2粒，Camzyos 10mg 或15mg 每日至多給付1粒，且2.5mg 不得與10mg 或15mg 併用。</u></p>	

備註：劃線部分為新修訂規定。