漁船醫藥箱應配置之藥品及器材種類

一、藥品種類

編號	規格 建議品名 建議中文名	單位	A 數量	B 數量	C 數量	D 數量	用途說明	適應症	用藥需知	副作用
1	Aspirin Tab 100mg (Acetylsalicylic Acid) Ascotyl E.M. Cap 100mg 暢血脈腸溶微粒膠囊	錠	300*	50	10	-	預防心肌梗塞；預防血栓性栓塞；預防中風。	男性短暫性缺血性發作、預防心肌梗塞、預防心栓性栓塞症。	如有不正常之瘀青或出血現象，請盡速就醫。 因出血風險增加，如須牙科檢查或外科手術，請告知醫師正吃此藥。 整粒吞服，不可咬碎顆粒。飯前或飯後服用均可。 未經醫師諮商前不得使用於兒童或二十歲以下青少年之水痘或流行性感冒症狀之解除。	噁心、嘔吐、胃腸不適、容易出血。
2	Diclofenac Potassium Tab 25mg Meitan Tab 25mg 漠疼膜衣錠	錠	300*	50	10	-	消炎止痛藥	緩解發炎及因發炎反應引起之疼痛。	不可飲酒。 有胃痛或過敏反應時應告知醫師。 使用本品可能發生罕見但嚴重之皮膚不良／過敏反應，如用藥後發生喉痛，口腔黏膜潰爛，皮疹等症狀，應考慮可能為藥品不良反應，宜立即就醫並考慮停藥。	消化性潰瘍、皮疹、腹痛、腹瀉、消化不良。

3	Acetaminophen Tab 500mgParamol Tab 500mg 普除痛錠	錠	300*	150*	100	-	退燒、止痛	退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。	飯前或飯後服用均可。	皮疹、體溫過低、肝毒性（過量）。
4	Prednisolone Tab 5mg DoNISON Tab 5mg 樂爾爽錠	錠	300*	50	-	-	類固醇，消炎，抗過敏	僂麻質斯性疾病、異常反應性疾病、皮膚病。	飯前或飯後服用均可。 服藥期間，身體抵抗力變差，避免接觸人群或有感冒之病人。	食慾增加，體液滯留，神經質或不安。
5	Chlorzoxazone/Acetaminophen 等複方口服 250/300mg SKETA Cap "Patron" 250/300mg 弛刻達膠囊	錠	100*	-	-	-	止痛與肌肉鬆弛劑。	關節痛、肌肉痛、顏面神經痙攣、神經痛、關節周圍炎、捻挫打撲及其他有肌肉之痙攣、強直及疼痛等之諸症。	勿飲酒。 服藥後，請小心開車或操作危險機械。	頭暈，昏昏欲睡。

6	Aluminum Hydroxide 、Magnesium Hydroxide 等複方錠劑 Aluzaine Tab 雅露佳錠	錠	500*	300	300	-	胃藥、制酸劑。	急、慢性胃炎所引起之胃痛、噁心、胃灼熱以及胃部不快感。	請勿與四環素及鐵劑併服。 因藥品含局部麻醉劑，若嚼碎服用，嘴部可能有不適感。建議整粒吞服。	腹瀉或便秘。
7	Pantoprazole Sod. Tab 40mg Pantoloc gastro-resistant 保衛康治潰樂腸膜溶衣錠	錠	300*	50	10	-	抗胃潰瘍用藥。	合併二種適當之抗微生物製劑治療與幽門螺旋桿菌相關之消化性潰瘍、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、中度及嚴重胃食道逆流性疾病、Zollinger-Ellison Syndrome。	整粒吞服，不可嚼碎；飯前或飯後服用均可。若有水瀉不止、腹痛、發燒需立即回診治療。	上腹疼痛，頭痛，視覺模糊，過敏反應如皮膚疹或搔癢。
8	Dioctahedral Smectite Powder 3gm Smecta, Powder For Oral Suspension	袋	300*	50*	10	-	止瀉劑。	治療 2 歲(含)以上兒童(併用口服脫水補充液)及成人之急性腹瀉。症狀性治療成人	藥品之吸附作用可能干擾其他藥物之吸收及排除，應儘量避免與其他藥品同時併用，建議間隔 2 小時以上。請泡於 50 毫升溫水後服用。若症狀在連續服用七天仍未改善，應告知醫師。	少數患者使用後可能出現便祕現象。

	舒腹達口服懸液用粉劑							之慢性功能性腹瀉。		
9	Metoclopramide Tab 3.84mg Promeran F.C.Tab 3.84mg 胃明朗膜衣錠	錠	300*	50*	10	-	止吐劑，促進胃腸蠕動。	預防嘔吐、逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常。	飯前半小時服用。	腹瀉，思睡，不安、四肢或眼睛不隨意運動、肌肉痙攣。
10	Bisacodyl EC Tab 5mg Bisacodyl Enteric Film Coated Tablets 5mg 秘克的腸溶膜衣錠 5 毫克	錠	200*	50	-	-	瀉劑。	暫時緩解便祕、診斷及手術前清腸。	整粒吞服，不可嚼碎。 勿與牛奶併服。	腹部不適，腹瀉。

11	Sennoside A+B Tab 20mg Through Tab 20mg 便通樂膜衣錠	錠	200*	50	-	-	緩瀉劑，治療便秘。	緩解便祕。	若有腹瀉發生，可先停藥或告知醫師。	腹瀉。
12	Acetaminophen/Chlorpheniramine/Dextromethorphan 等複方口服劑 Flutafin Anti-Cold Capsules 伏冒能綜合感冒膠囊	顆	300*	150*	100	-	感冒諸症狀（鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛）。	感冒諸症狀（鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛）。	一日服用三次，飯後 30 分鐘服用。	胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
13	Salbutamol Sulfate(Albuterol Sulfate) Inhaler Ventolin Inhaler 200dose/bot 泛得林定量噴霧劑	件	2*	1*	-	-	支氣管痙攣口腔吸入劑。	支氣管痙攣。	第一次使用或者超過 5 天沒用，請先噴掉 2 下。 請依照醫囑使用，每日最多吸入 8 噴。每罐可噴 200 下。 使用前充分振搖吸入器。若不喜歡藥物味道，可在使用後漱口。 請依照說明書內指示使用；室溫儲存，避免陽光直曬。 若使用後仍持續呼吸困難或更嚴重，請立刻告知醫師。	心跳加快、頭痛、發抖、咳嗽。

14	Opium Tincture、Glycyrrhizic Acid 等複方口服液劑 Liquid Brown Mixture "CENTER" 甘草止咳水	瓶	50*	20*	1	-	化痰止咳藥水	鎮咳祛痰。	飯前或飯後服用均可。請依醫師指示劑量使用，勿自行增加藥量。不得併服含酒精飲料。服用此藥可能導致尿液篩檢異常。	思睡、眩暈、噁心、嘔吐。
15	Ampicillin Cap 500mg Ampicillin Cap 500mg 安比西林膠囊	顆	300*	100	-	-	抗生素、殺菌消炎。	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。	飯前 1 小時，或飯後 2 小時服用．	噁心、嘔吐、腹瀉、皮疹、過敏。
16	Ciprofloxacin Tab 500mg Superocin F.C. Tablets 500mg "Weidar" 速倍樂膜衣錠 500 毫克	錠	200*	50*	-	-	抗生素、殺菌消炎。	CIPROFLOXACIN 有感受性之細菌所引起之呼吸道感染、中耳炎、竇炎、眼感染、腎臟及泌尿道感染（包括淋病）、腹部感染（包括腹膜炎）、皮膚及軟	整顆和水一起吞服。不可和乳製品或礦物質含量高之食品併服。服藥後如出現肌腱疼痛、腫脹或發炎症狀，須立即回診告知醫師。本藥和含多價陽離子藥物併用時，應在這些製劑服用前 1－2 小時或服用後至少 4 小時才可服用。	噁心、腹瀉、頭痛、顫抖、光敏感、皮疹。

								組織感染、骨髓炎、關節感染、菌血症。成人和小孩：吸入性炭疽病（接觸後）。小孩：大腸桿菌所引起之複雜性泌尿道感染和腎盂腎炎(1-17 歲)、綠膿桿菌有關之囊腫性纖維化產生急性肺部惡化現象（5-17 歲）。		
17	Colchicine Tab 0.5mg Colchicine Tablets 0.5mg "Synmosa" 秋水仙鹼片 0.5 毫克	錠	100*	100	100	-	痛風用藥、免疫調節劑。	痛風。	服藥後可能引起腹瀉，可停藥或告知醫師。 飯前或飯後服用均可。	噁心，嘔吐，腹部疼痛，腹瀉。

18	Ascorbic acid Tab 500mg vitamin C "PURZER" Puro C TABLETS 500MG 普樂 C 錠 500 毫克	瓶	300*	100	-	-	壞血症、齒齦出血、維他命 C 缺乏症。	壞血病、齒齦出血、維他命 C 缺乏症。	飯前或飯後服用均可；不宜長期大劑量服用；有腎結石病史或蠶豆症(G6PD 缺乏)者服用前應告知醫師。	大劑量服用可能引起腹瀉、腹脹、噁心等腸胃不適；長期過量可能增加腎結石風險。
19	Activated Charcoal Granules 50gm Carbomix Granules For Suspension 蓋抹滅顆粒劑	瓶	1*	1*	1	-	吸附劑。緊急治療藥物或化學品中毒之病人。	緊急治療藥物或化學品中毒之病人。	瓶裝蓋抹滅顆粒劑，加入蒸餾水到標籤上之紅色線（50 公克瓶裝約加 400 毫升）後徹底搖勻。均勻混合之懸浮液，可廣泛用以吸附引起口服中毒之各種毒性物質。	便祕、腹瀉。
20	Chlorpheniramine Maleate Tab 4mg Benda Tab 4mg 敏達錠	錠	100*	50	-	-	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。預防或緩解暈車所引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛。	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。	可能造成嗜睡，不可飲酒，避免長途開車及操作危險器械。 飯前或飯後服用均可。	鎮靜昏睡、口乾。

21	Erythromycin Oph Oint 0.5% 3.5gm Erythromycin Ophthalmic Ointment 0.5% "Synmosa" "健喬" 紅黴素眼藥膏 0.5%	件	6*	3	1	-	眼部細菌傳染性炎症。	眼部細菌傳染性炎症。	切勿內服。 開封以後 4 週即丟棄不用。	少發生副作用。
22	Prednisolone Eye Drop 1% 5ml 1% Pred Forte Ophthalmic Suspension 倍力特眼用懸浮液	瓶	6*	2	1	-	類固醇眼藥水，消炎、抗過敏。	過敏性眼瞼緣炎、結合膜炎、潰瘍性角膜炎、異物入侵所引起之炎症。	局部類固醇製劑可能會隱蔽或加重急性感染之眼疾，應遵照醫師指示使用。 本藥品為一懸浮劑，使用前請充分振搖。 開封以後 4 週即丟棄不用。	增加眼內壓力。
23	Sodium Chloride Irrigation 500ml N.S. Irrigation "Y.F." 生理食鹽水沖洗液”永豐”	瓶	6*	1*	1	-	生理食鹽水沖洗液。	皮膚、創傷面黏膜等之洗淨、含漱，支氣管黏膜洗淨。促進咳痰排出及醫療用器具之洗淨。	生理食鹽水沖洗液。	罕見。

24	Polymyxin B Ear Drop 8ml Otozambon Ear Drops 耳多贊邦點耳液劑	瓶	6*	2	-	-	急慢性耳部感染點耳藥水。	細菌性引起之耳部感染及耳部外聽道發炎。	滴於耳孔內，不要連續使用 10 日以上。	偶有過敏現象、聽力受損。
25	Ofloxacin 0.3% 5ml Ofloxin Otic 0.3% 5ml 耳普欣點耳液 0.3%	瓶	10*	5	1	-	急慢性耳部感染點耳藥水。	成人及小兒外耳炎、成人及青少年鼓膜穿孔之慢性中耳炎、裝有鼓膜造口管之小兒急性中耳炎。	僅可以點耳法使用，給藥時儘可能在與體溫相近溫度下使用室溫儲存。使用時身體橫躺，患耳向上，頭部保持水平。瓶口勿接觸耳朵，依醫囑滴耳後維持原姿勢靜躺約 10 分鐘。以乾淨紗布或衛生紙覆蓋耳朵後起身，並將外圍藥液擦乾。	耳痛或過敏反應，頭痛。
26	Dexamethasone 0.1% 5gm Smile Orabase 1mg/G "Winston" 微笑口內膏 1 公絲/公克	條	6*	2	-	-	類固醇口內膏	糜爛或潰瘍伴隨口內炎或舌炎。	勿接觸眼睛。塗抹於口腔內。 使用後暫勿飲水或進食，建議飯後或就寢前使用。	口腔內感染、過敏反應。
27	Nifedipine Cap 5mg Atanaal Capsule 5 壓達能軟膠囊 5 毫克	錠	200*	50	10	-	可用於狹心症或高血壓。	狹心症(心絞痛)：包括血管痙攣性心絞痛、慢性穩定型心絞痛。高血壓：使	飯前或飯後服用均可。 服藥期間，請避免大量飲用葡萄柚汁。	頭痛、頭暈、疲倦、心悸。

								用 nifedipine 短效劑型治療高血壓，可能會發生血壓驟降、反射性心搏加速而引起心血管併發症。僅在無其他適合療法時，才可使用 nifedipine 短效劑型治療高血壓，且不建議舌下投予 nifedipine 膠囊。		
28	Betamethasone/Lidocaine/Phenylephrine 等複方 Oint 15gm High-Xylmol Oint 15gm 樂癒痔軟膏	件	6*	2	2	-	用於痔瘡、肛門濕疹或潰瘍等。	外痔核、痔出血、痔疼痛、肛門裂創、肛門周圍炎、肛門搔癢症、肛門濕疹、肛門潰瘍。	使用前請先將患部洗淨，再以適量軟膏塗佈於患部。 如醫師指示，本藥可使用於直腸內。	局部發紅、灼熱或刺痛感、搔癢、皮膚脫屑。

29	Cadexomer Iodine Powder 3gm/Pkg Iodosorb Powder 3gm/Pkg 愛得寶外用撒布散	件	3*	2	1	-	外用收斂、殺菌製劑。	慢性靜脈潰瘍之輔助治療，感染性傷口之輔助治療。	外用製劑，切勿內服。	局部刺激感、接觸性皮膚炎；因含碘成分，可能引起過敏反應。
30	Permethrin 5% Cream Permethrin Cream 5% W/W 60gm 滅疥乳膏	件	12*	2	-	-	治療疥蟲感染。	治療疥蟎感染（疥瘡）。	患者應使用軟膏徹底從頸部按摩到腳底，包括在手指甲和腳趾甲區之皮膚。 幼兒和老年患者之髮際、頸部、鬢角、前額可能會受感染也需塗抹。塗抹後 8－14 小時應淋浴清洗。 協助塗抹者請戴手套，以避免傳染。	局部刺激、紅疹、局部麻木感。
31	Chlorhexidine Gluconate, Liquid Easy Antiseptic Liquid 2% 克菌寧殺菌液 2%	瓶	3*	1	1	-	手術前手部消毒、病房手部消毒、病人皮膚消毒。	手術前手部消毒、病房手部消毒、病人手術前皮膚消毒。	開封後，立即旋緊，並儲存於 25°C 以下避免陽光直射之陰涼處，開封有效期限為 1 個月，但若有醫療器材（棉棒）直接沾取，則需於一週使用完畢，且不得逾原有效日期。 分裝瓶內液若當日未用完，剩餘量請丟棄。	可能出現局部皮膚乾燥、刺激、過敏性接觸性皮膚炎。
32	Povidone-Iodine 10% Sindine Solution "Sinphar" (Povidone-Iodine) 金碘藥水 (普威隆碘)	瓶	4*	2	1	1	皮外之傷口及傷口周圍之洗淨、消毒、殺菌。	緊急處理擦傷、切傷、刺傷、抓傷等導致皮外之傷口及傷口周圍之洗淨、消毒、	本藥限於外用，不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜。 可能干擾甲狀腺功能試驗。 除非醫師指示，否則使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封。 本品可能會使皮膚或衣物染色。	局部過敏、紅腫、刺激感或疼痛。

								殺菌來防止傷口感染。		
33	Sodium Potassium glucose 等複方口服脫水補充 高優活電解質補給沖泡飲	件	50*	20	5	-	運動大量流汗或生病前後之體液補充。	運動流汗後、發燒/腹瀉/嘔吐等病中病後脫水之體液及電解質補充，不屬於治療特定疾病之藥品適應症。	沖泡後請於 24 小時內飲用；產品若有破損或封口不良請勿食用；腎病患者或需控制鹽分攝取者請謹慎使用。保存需置於乾燥陰涼處，避免陽光直射。	罕見。
34	Water for Inj 20ml Water for Inj 20ml "TBC" "信東"注射用水	盒	3*	2	-	-	注射用蒸餾水。	粉末注射藥之溶解劑。	本品用當注射藥品之溶劑或供醫療器械之潤洗，禁止直接注射於人體。 本品須於使用之前開啟，且僅限使用一次，倘有餘液均應丟棄，不得留存再用。	無副作用，不可直接用於人體。

35	Alcohol 75% 500ml Kespol 75% Ethanol Solution 克司博 75%酒精液	瓶	6*	2*	1	-	肌膚及手部清潔、消毒、殺菌。	肌膚及手部清潔、消毒、殺菌。	含高濃度酒精，請遠離火源及避免直接日曬，置於通風良好處，緊蓋容器，儲存於 30°C 以下。 藥品開封後，請於半年使用完畢，且勿超過原有效期限。 若經分裝後，則需於三個月內使用完畢，並不得超過原開封有效期限。不可口服。	可能造成皮膚乾燥、局部刺激感或輕微刺痛，尤其塗抹於破損皮膚時；避免接觸眼睛、黏膜及大範圍傷口。
36	Aluminum Hydroxide/Magnesium Hydroxide 等複方懸液劑 Aluzaine Suspension "Standard" 雅露佳懸浮液	瓶	6	-	-	-	胃藥、制酸劑。	胃潰瘍、十二指腸瘍、食道炎。	用前搖勻；請勿與四環素及鐵劑併服。	腹瀉或便秘。
37	Lidocaine、Aluminum Acetate、Zinc Oxide、Hydrocortisone 等複方栓劑 Xylmol Suppository "Sinphar" 喜癒痔栓劑	顆	72	12	-	-	痔瘡及肛門直腸裂隙和破裂所引起之疼痛、出血、搔癢及發炎。	痔瘡及肛門直腸裂隙和破裂所引起之疼痛、出血、搔癢及發炎。	使用時須除去藥物包裝。僅供外用，勿內服。 於排便後塞入。	肛門刺激性。

38	Hyoscine Butylbromide Tab 10mg Linton Tab 10mg "KOJAR" 寧痛膜衣錠 10 毫克	錠	300	50	10	-	疼痛解痙用藥。	胃、十二指腸潰瘍、食道痙攣、幽門痙攣、胃炎、腸炎、膽管炎、膽結石、尿路結石、痙攣性月經困難等痙攣性疼痛。	飯前或飯後服用均可。 可能造成嗜睡，避免開車及操作危險器械。若有青光眼，攝護腺肥大或排尿困難，潰瘍性結腸炎，或心律不整等病史，服藥前請記得告訴醫師。	暈眩、想睡、視力模糊、便秘、口乾。
39	Metoclopramide Inj 10mg/2ml Primperan 10mg/2ml Injectable Sol 腹寧朗注射液	瓶	10	-	-	-	止吐、促進胃腸蠕動。	預防嘔吐，逆流性消化性食道炎，糖尿病引起之胃腸蠕動異常。	可能引起嗜睡。 勿飲酒或與中樞神經抑制劑併服。 肌肉或靜脈注射使用。	腹瀉，思睡，不安、四肢或眼睛不隨意運動、肌肉痙攣。
40	Loperamide Cap 2mg Loperam Cap "Johnson" 肚倍朗膠囊	顆	200	50	-	-	止瀉劑。	急性、慢性腹瀉。	飯前或飯後服用均可。服藥期間多喝水。	便秘。

41	Procaterol HCl hemihydrate Tab 25mg Mixapin Tablets 25mcg "H.S." 弭喘平錠 25 微公克	錠	200	50	10	-	支氣管擴張劑。	支氣管氣喘、慢性支氣管炎、肺氣腫諸患者之氣道閉塞性障礙。	飯前或飯後服用均可。 有甲狀腺機能亢進、高血壓、糖尿病史者，應告知醫師。	顫抖、頭痛、心跳過快、噁心、嘔吐。
42	Acetylcysteine Effervescent Tab 600mg Actein Effervescent Tab 600mg 愛克痰發泡錠	錠	100	100	100	-	減少呼吸道粘膜分泌之粘稠性。	減少呼吸道粘膜分泌之粘稠性、蓄意或偶發之 ACETAMINOPHEN 中毒之解毒劑。	飯前或飯後服用皆可。 將發泡錠置於飲水容器中，加少量水溶解，混合均勻後直接飲用。 本品含阿斯巴甜賦形劑，苯酮尿症患者不宜使用。	噁心、嘔吐、瀉肚子。
43	Amitriptyline HCl Tab 25mg Trynol Tab 25mg 德利能糖衣錠	錠	100	100	-	-	神經精神用藥。	憂鬱病。	避免飲酒。 小孩、青少年及年輕人，可能增加自殺意念及行為。	口乾、視力模糊、便祕、嗜睡、暈眩。
44	Gabapentin Cap 300mg Neurontin Cap 300mg 鎮頑癲膠囊	錠	100	-	-	-	抗癲癇藥物、神經性疼痛用藥或其他。	治療成人及三歲以上兒童局部癲癇發作之輔助療法。帶狀庖疹後神經痛。	第一天服藥，應在睡前以避免頭暈嗜睡。 可能造成頭暈，不可飲酒，避免長途開車及操作危險器械。 飯前或飯後服用均可。	部分可能出現嗜睡、頭昏、運動失調。

45	Levetiracetam Tab 500mg Keppra Tab 500mg 優閒膜衣錠	錠	200	50	-	-	抗癲癇藥物。	十六歲以上病人之局部癲癇發作(併有或不併有次發性全身發作)之單獨治療。 四歲以上孩童或成人病人之局部癲癇發作(併有或不併有次發性全身發作)，十二歲以上青少年與成人病人之肌抽躍性癲癇發作，以及十二歲以上青少年與成人患有體質性泛發性癲癇之原發性泛發性強直陣攣發作之輔助治療。	飯前或飯後服用均可。 可能造成頭暈，不可飲酒，避免長途開車及操作危險器械。 若使用該藥已有數周，停藥前應告知醫務人員。	部分可能出現頭昏、想睡、噁心、嘔吐、震顫。

46	Amoxicillin/Clavulanic Acid 等複方 Tab 875mg/125mg Curam 1000mg Dispersible Tablets 諾快寧口溶錠 1000 毫克	錠	70	35	-	-	抗生素、殺菌消炎。	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。	口溶錠可先與半杯水（至少 30 毫升）攪拌後再吞服；或是放入口中，待口溶錠崩散後再吞服。為了將此藥物對腸胃所造成之不適降至最低，及得到最佳吸收效果，應於用餐開始時服用。服藥後若出現皮膚紅疹，請立即就醫。	噁心、嘔吐、腹瀉腹脹、食慾不振、頭痛、眩暈。
47	Cefadroxil Cap 500mg Cefadroxil Capsules 500mg "Tbc" 賜福得修膠囊 500 毫克	顆	200	50	-	-	抗生素、殺菌消炎。	革蘭氏陽性菌及陰性菌所引起之感染症。	飯前或飯後服用均可。若有皮膚癢、過敏反應發生，應停藥並儘快就診。	噁心、嘔吐、腹瀉、皮疹。
48	Trimethoprim/Sulfamethoxazole 等複方 Tab 80mg/400mg Bacide Tablets 菌特制錠	錠	200	100	-	-	抗生素、殺菌消炎。	由革蘭氏陽性菌、陰性菌所引起之呼吸道、胃腸道及泌尿道感染症。	服藥時請多喝水（限水病人請先詢問醫師斟酌水份用量）。 蠶豆症（G6PD 缺乏症）患者請小心使用。 避免喝酒。可能容易曬傷，請避免接觸陽光或使用防曬乳液、穿防防曬之衣物或使用太陽眼鏡。 請空腹時服用（飯前一個小時或飯後兩個小時）。	噁心、食慾不振、光敏感、蕁麻疹。

49	Doxycycline hydrochloride Cap 100mg Doxynin Capsules "Swiss" 得喜寧膠囊”瑞士”	顆	200	-	-	-	抗生素、殺菌消炎。	治療由感受性革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌所引起之感染症。	飯前或飯後服用均可。服藥後多喝水，且勿馬上平躺，以降低對食道之刺激。若與制酸劑、鐵劑、鎂劑、鋁劑、鈣劑併服，需間隔 2 小時。與牛奶併服不會影響這個藥物之吸收。 服用期間避免長久暴露於日曬下，可能引起光過敏反應，請做好防曬措施。	噁心、嘔吐、食慾不振、光敏感、貧血、中性白血球減少、牙齒變色。
50	Erythromycin Estolate Cap 250mg Erymycin Capsules 250mg 毅力黴素膠囊 250 毫克	顆	300	100	-	-	抗生素、殺菌消炎。	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。	請飯後服用，避免與酸性果汁服用。 不要吃葡萄柚或喝葡萄柚汁。	噁心、嘔吐、腹瀉、膽汁鬱積性黃疸、過敏、蕁麻疹。
51	Azithromycin Dihydrate Tab 250mg Zirocin F.C. Tablets 250mg 美妥欣膜衣錠 250 毫克	錠	36	-	-	-	抗生素、殺菌消炎。	革蘭氏陽性、陰性及厭氧菌引起之下呼吸道感染(支氣管炎及肺炎)、皮膚及軟組織感染、中耳炎、上呼吸道感染和性傳染病。	飯前或飯後服用均可。 室溫避光保存。	噁心、嘔吐、腹瀉腹脹、食慾不振、頭痛、眩暈。

52	Metronidazole Tab 250mg Frotin Enteric Sugar Coated Tab 服樂淨腸溶糖衣錠	錠	500	200	-	-	抗生素、殺菌消炎、殺原蟲劑。	治療陰道滴蟲感染所引起之陰道炎、白帶、阿米巴痢疾、阿米巴肝膿腫及對METRONIDAZOLE 具有感受性之厭氣菌所引起之嚴重感染。	服藥期間會使尿液呈現暗棕色。 服藥期間勿飲酒（以避免發生腹部絞痛、噁心、嘔吐、頭痛、潮紅等不適症狀）。	噁心、口乾、口內炎、頭痛、眩暈、金屬味覺。
53	Cefazolin Inj 1gm Cefa Inj 1gm 信華注射劑	瓶	60	-	-	-	抗生素、殺菌消炎。	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。	安定性：溶解後避光室溫 48 小時或放置冰箱 96 小時內用完。 肌肉注射或靜脈注射、靜脈點滴注射。以 NS 或注射用水或 D5W 加以溶解配製。也可與輸注液混合稀釋。 用於術前預防感染時，應於手術前 0.5－1 小時投予。	注射部位疼痛、皮膚紅疹、噁心或嘔吐、腹瀉。
54	Valaciclovir Tab 500mg Valtrex Tab 500mg 祛疹易錠	錠	200	-	-	-	抗病毒藥物。	帶狀疱疹、復發性生殖器疱疹之預防及治療。	飯前或飯後服用均可。	噁心、嘔吐、腹痛、頭痛、眩暈、虛弱無力。

55	Mefloquine Tab 250mg Mefloquine 250mg Tablets “AA Pharma” 安保克瘧錠 250 毫克	錠	100	-	-	-	治療及預防瘧疾。	治療及預防瘧疾。	建議飯後服用，並且至少搭配一杯水或飲料整顆吞服(具苦味及輕微灼熱感)。若無法整顆吞服，可將藥錠碾碎，懸浮於少量水、牛奶或其他飲料中服用。服藥後 30 分鐘內若發生嘔吐，應再服一次完整劑量；若服藥後 30-60 分鐘嘔吐，則應補充前次服劑量之一半。接種減毒疫苗後三天內不建議開始使用此藥。易受潮，至服用前才可取出。	噁心、嘔吐、暈眩、腹瀉、腹痛、睡眠失調。
56	Mebendazole Tab 100mg Cowbalin Tablets 100mg (Mebendazole) "Kojar" 疳福錠 100 毫克（美苯噠唑）	瓶	60	-	-	-	驅除鞭蟲、蛔蟲、鉤蟲及蟯蟲。	驅除鞭蟲、蛔蟲、蟯蟲及鉤蟲。	可咬碎或整粒吞服。 飯前或飯後服用均可。服用時不需禁食或清腸通便。	暫時性腹痛或腹瀉。
57	Calcium Phosphate or Calcium Gluconate 等複方鈣片 "ZM"Calcium Gluconated Tablets	盒	1	-	-	-	鈣、磷質缺乏引起之軟骨症、皮膚病、妊婦、哺乳期鈣質之補給。	鈣、磷質缺乏引起之軟骨症、皮膚病、妊婦、哺乳期鈣質之補給。	避光室溫保存。 本藥品為含有維生素D之鈣質補充劑。 不可與四環黴素一起服用。 本藥含鈣，腎疾病或腎結石患者，應洽醫師診治後服用。	高鈣血症、低鎂血症、低磷血症。

	葡萄糖鈣丁片錠									
58	Chlorpromazine HCl Tab 100mg Morefine F.C. 莫煩錠	錠	100	50	10	-	神經精神用藥、打嗝用藥。	躁病、精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙。	可與食物併服以降低胃部不適。	想睡、嗜睡、心跳加快、鼻塞、姿勢性低血壓、錐體外症狀。
59	Haloperidol Inj 5mg/ml Binin-U Inj 易寧優注射液	盒	2	1	-	-	神經精神用藥。	躁病、精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙、舞蹈病。	肌肉或靜脈注射給藥。	錐體外症狀、口乾、鼻塞、低血壓、便祕、嗜睡、暈眩。
60	Meclizine HCl Tab 25mg Meclizine 美克利靜片	瓶	4	1	1	-	頭暈、止吐、暈車藥。	預防或緩解動暈症（暈車、暈船、暈機）引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀。	可能造成口乾、不可飲酒，避免長途開車及操作危險器械。 飯前或飯後服用均可。	昏睡、口乾、鼻乾、排尿困難。

61	Proparacaine Hydrochloride Oph. Sol'n 5mg/ml 5ml Proparacaine Hydrochloride Oph. Sol'n 5mg/ml 5ml 五福普洛拍拉卡因眼藥水 5 公絲/公撮	瓶	2	1	-	-	眼用局部麻醉劑。	適用於需要快速及短時間之眼科用表面麻醉劑。	如有過敏反應請勿使用。 開封以後 4 週即丟棄不用。 建議於冰箱(2~8°C)儲存。	局部刺激和刺痛感。
62	Chloramphenicol Eye Drop 0.25% 10ml Chloramphenicol Ophthalmic Solution 0.25% "Synmosa" 10ml "健喬" 氯絲菌素眼藥水 0.25%	瓶	3	2	1	-	抗生素、殺菌消炎眼藥水。	沙眼、葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、大腸桿菌等所引起之疾患。	切勿內服；冷藏儲存。 併用眼藥膏時，先用藥水 10 分鐘後再用藥膏。 建議 4 周內需使用完畢。 若暫時離開冷藏環境，並維持在 25 度以下，非陽光照射可保存一天。	局部刺激。
63	Pilocarpine hydrochloride eye-drops 1%	瓶	2	1	-	-	降眼壓眼藥水。	縮瞳劑、用於治療原發性隅角開放性青光眼和急性隅角閉鎖性青光眼。	切勿內服。 開封以後 4 週即丟棄不用。	局部刺激和刺痛感。

	Pilocarpine Ophthalmic Solution 1%"WUFU 毛果芸香/眼藥水 1%									
64	Furosemide Tab 40mg Rosis Tablets 40mg "榮民" 樂泄錠 40 毫克	錠	100	-	-	-	利尿劑、消水腫。	利尿、高血壓。	建議白天服用。避免由坐姿或躺臥時突然站立，易產生暈眩。飯前或飯後服用均可。避免喝酒，避免日曬過久。	姿態性低血壓、暈眩、電解質不平衡。
65	Nitroglycerin Tab 0.6mg 25#/Bot Nitrostat 0.6mg 耐絞寧錠	瓶	2	1	1	-	治療心絞痛。	狹心症之治療及預防。	如有胸部不適，請以坐姿即刻服用，放於舌下，藥物約 30 秒溶解，服藥後 3—5 分鐘內不適症狀未緩解，服第二片，3—5 分鐘後如仍未緩解，可服第三片並立即至醫院急診室接受醫師檢查與治療。 若近期（24—48 小時）內有服用如威而鋼、犀利士、樂威壯等藥物時應避免使用。	頭痛、臉潮紅、低血壓、心跳快。

66	Isosorbide Dinitrate Tab 10mg Isobide Tab 10mg "Weidar" 易適倍錠	錠	200	50	10	-	心血管擴張劑。	預防狹心症之發作。	建議於飯前半小時或飯後 1 小時服用； 或依照醫師指示服用。	頭痛、皮膚過敏、血壓低、皮膚紅疹。
67	Diltiazem Hydrochloride Tab 30mg Cartil Tablets 30mg 卡迪爾錠 30 毫克	錠	200	50	10	-	狹心症、輕度至中度之本態性高血壓	狹心症、輕度至中度之本態性高血壓。	建議於飯前半小時服用；或依照醫師指示服用。 避免吃葡萄柚或喝葡萄柚汁。 限制酒精之使用量（包括葡萄酒、啤酒或甜酒）。	頭痛、便秘、心跳慢。
68	Propranolol HCL Tab 10mg Propranolol Tablets 10mg 心律錠 10 毫克”生達”	錠	200	50	10	-	可用於高血壓、狹心症、心律不整、甲狀腺機能亢進、焦慮症、顫抖、偏頭痛預防、或其他。	狹心症、不整律（上心室性不整律、心室性心搏過速）、原發性及腎性高血壓、偏頭痛控制原發性震顫控制焦慮性心搏過速、甲狀腺毒症之輔助劑、親鉻細胞瘤。	飯後立即服用；若有心跳過慢不適感，應告知醫師。 支氣管哮喘患者，應告知醫師。	心跳變慢、疲倦。

69	Diflucortolone Valerate Cream 0.1% 30gm Enfulon Cream 1mg/Gm 宜膚隆乳膏	件	6	2	2	-	類固醇外用藥膏。	牛皮癬、皮脂溢出性濕疹、尿布疹、汗疹。	本產品不適合用在眼部。 避免陽光直射，宜保存於陰涼處。	局部副作用如皮膚萎縮、皮膚發紅、灼熱感、脫屑。
70	Salicylic Acid-Benzoic Acid 等複方 Oint 30gm Salicylic Acid And Benzoic Acid Ointment 30gm 速必舒軟膏	件	2	1	-	-	皮膚炎、黴菌感染。	角質溶解劑、殺黴菌劑。	切勿內服。	局部皮膚刺激感、灼熱、發紅；大面積塗抹或長期使用於受損皮膚，水楊酸可能經皮膚吸收引起中毒（罕見但需留意）。
71	ZnO/Diphenhydramine/Dibucaine 等複方 Lotion 130ml Sinbaby Baby Lotion "Sinphar" 金貝比嬰兒洗劑(130毫升)	瓶	8	1	-	-	緩解皮膚刺激及尿布疹、暫時緩解皮膚搔癢、昆蟲咬傷或皮膚刺激所引起之疼痛及搔癢。	緩解皮膚刺激及尿布疹、暫時緩解皮膚搔癢、昆蟲咬傷或皮膚刺激所引起之疼痛及搔癢。	一日 2 至 3 次，適量塗擦於患部，用前請搖勻。 切勿內服。不可用於眼睛內、眼睛四周或黏膜。 使用後請保持塗抹部位透氣。 除非醫師指示，否則患部有傷口或紅腫時，建議不要使用。	局部灼熱、刺痛、偶有過敏性反應。

72	Nystatin Neomycin Gramicidin Triamcinolone Cream My Comb Cream "Sinphar" "杏輝"美康乳膏	件	6	2	-	-	濕疹、過敏性和發炎性皮膚病、細菌、黴菌之感染症。	濕疹、過敏性和發炎性皮膚病、續發性細菌或黴菌感染（念珠菌感染）。	切勿內服，不可用以點眼及在眼圈附近塗敷。	局部皮膚燒灼感或搔癢。
73	Lidocaine hydrochloride Inj Lidocaine Inj 2% 20ml "TAI YU" 利都卡因注射液 2%	件	12	-	-	-	局部麻醉劑。	局部麻醉。	不可靜脈投與。本品含防腐劑，不可用於脊椎及硬膜外麻醉。 主要劑量應以每分鐘 100 至 200 毫克之速率緩慢注射。 多劑量藥瓶在開瓶後保存期限為：室溫下 3 天；或冷藏(2-8°C)7 天。超過上述期限，不可再使用。	嗜睡、不安、霧視、皮膚過敏；(局部) 腫、灼熱感、刺痛。
74	Tetanus Toxoid Inj 0.5ml Adsorbed Tetanus Vaccine B.P. 吸著破傷風類毒素疫苗 0.5 毫升	件	10	-	-	-	預防破傷風。	預防破傷風。	使用前請搖勻。肌肉注射。 冷藏 2~8°C 保存，禁止冷凍保存。 注意接種當日及翌日避免激烈運動並保持接種部位之清潔，如接種後呈現高燒或痙攣症狀時，請找醫師診察。	注射部位局部反應、發燒、不適、煩躁感、紅疹、搔癢與暈眩。

75	Neomycin Sulfate Oint 0.5% Neomycin Ointment 0.5% 28gm 新黴素軟膏	件	20	10	5	-	抗生素外用藥膏	緊急處理、預防因皮膚外傷(如刀傷、擦傷、刺傷、抓傷、磨傷、輕微燙傷)造成感染或減緩傷口感染。	切勿內服；勿接觸眼睛。	接觸性皮膚炎。
76	Sodium Chloride Inj 0.9% 500ml Sod. Chloride Inj 0.9% 500ml/bag 生理食鹽水注射液	瓶	6	2	-	-	生理食鹽水輸注液。	大手術或創傷時之急性出血、心臟衰弱、虛脫、解毒、腹膜炎、炎傷、傳染病、大腸炎、尿毒症、中毒及其他病症所引起之失水狀況。	由靜脈緩慢點滴注射；或經皮下、肌肉、靜脈注射等其他途徑使用。 若藥液有不澄清、變色、異物或現象時，請勿使用。 軟袋內外袋皆經高壓蒸氣滅菌，為保持產品之無菌性，請在使用前始將外袋撕棄。	副作用罕見，大量輸注需留意體液過量。
77	Sodium Chloride Tablets 600mg Sodium Chloride Tablets 600mg“Weal-Chance”	瓶	2	1	1	-	體內電解質補充劑，補償由出汗過多和引起之失水。	體內電解質補充劑、補償由出汗過多而引起之失水。	每次一錠，與水共服或加入飲水中服用。	過量服用可能引起噁心、嘔吐、腹脹。

	食鹽錠 600 毫克									
78	Zinc oxide Oint 28.4gm ZIN Oint 28.4gm 氧化鋅軟膏	條	12	3	3	-	緩解皮膚刺激及尿布疹。	緩解皮膚刺激及尿布疹。	切勿內服。	少發生副作用。
79	Omeprazole Cap 20mg Omezol Cap. 20mg "Standard" 瘍寧膠囊	顆	140	70	-	-	消化道潰瘍用藥。	十二指腸潰瘍、胃潰瘍、逆流性食道炎、ZOLLINGER-ELLISON 症候群、合併抗生素治療與幽門螺旋桿菌(HELICOBACTER PYLORI)相關之消化性潰瘍。	請於飯前一小時服用；請整粒吞服，勿咀嚼。若有水瀉不止、腹痛、發燒需立即回診治療。	皮疹、便秘、下瀉、噁心。

80	Ondansetron Tab 8mg Zofran Tab 8mg 卓弗蘭膜衣錠	錠	10	-	-	-	止吐劑。	細胞毒性化學療法及放射線療法所致之噁心及嘔吐，以及手術引起之噁心、嘔吐。	育齡女性於服藥期間至停藥後 2 天內，請使用有效方式避孕。若發生下列副作用，應儘快告知醫師：過敏反應、皮膚癢、喉嚨及嘴巴浮腫、呼吸困難。與其他會增加 Serotonin(血清素)濃度之藥品併用時有較高風險出現意識混亂、躁動不安、肌肉抽蓄或僵硬、發燒、出汗增加、心搏加快、血壓不穩定等症狀。	便秘，腹瀉，頭疼。
81	Ketoconazole Cream 20mg/g,10g Ketosone Cream 20mg/Gm "PBF" 潔得爽乳膏	條	10	5	-	-	抗黴菌藥。	皮膚黴菌及酵母菌所引起之皮膚、頭髮、指甲感染症。	切勿內服，勿接觸眼睛。	燒灼感，刺激感。
82	Sulfadiazine Silver Cream 500gm "Sinphar" Siliverzine Cream 10mg/Gm “杏輝”燙膚舒乳膏 10 毫克/公克（達淨磺胺銀）	瓶	3	1	-	-	局部預防及治療二級、三級燒傷之傷口化膿。	局部預防及治療二級、三級燒傷之傷口化膿。	外用製劑，切勿內服。 先清潔患處後，以無菌手套塗敷本劑 2－3mm 厚，在塗敷後不需馬上裹上紗布。第二日將前日乳膏清潔或以溫水洗掉，再繼續塗敷。	搔癢，局部刺激皮膚，皮疹。

83	Dexamethasone Inj 5mg/ml Methasone Inj 5mg/ml "VPP" 敏速平注射液	瓶	1	-	-	-	類固醇，消炎，抗過敏。	醣副腎皮質素適應症、如 ADDISON 病、免疫性病、發炎病症、急性休克。	關節或軟組織內注射、靜脈或肌肉注射。	偶有精神改變、代謝異常。
84	Ceftriaxone (Disodium 3.5H2O) Inj 2gm Cefin For I.V. Inj "Panbiotic" 舒復靜脈注射劑	瓶	10	-	-	-	抗生素、殺菌消炎。	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。	對 Cephalosporin 過敏者，不建議使用此藥。不可加入含鈣溶液(包括 Ringer's 溶液)也不可同時投與(含 Y 型管)。日齡 28 天(含)以下新生兒，即使分開管路，也不可同時用含鈣針劑。肌肉注射、靜脈注射(超過 2-4 分鐘)或靜脈輸注給藥(至少 30 分鐘)。靜脈用:以 20ml 滅菌注射用水配置，安定性室溫 6 小時、冷藏 24 小時。	下痢、頭昏、嘔吐。
85	Zidovudine plus Lamivudine 複方口服藥 Combivir Tab. 卡貝滋錠劑	錠	60	-	-	-	抗病毒藥物。	與其他抗反轉錄病毒劑併用，以治療 HIV-1 感染。	飯前或飯後服用均可。	噁心腹瀉、頭痛、骨骼肌肉疼痛、神經病變、疲倦、肝毒性。

86	Cetirizine Tab 10mg Cetimin Film Coated Tab 10mg "C.H" 喜克敏膜衣錠 10 公絲	錠	100	50	10	-	抗過敏、感冒流鼻水、鼻塞、蕁麻疹。	季節性鼻炎、結合膜炎、過敏性鼻炎、蕁麻疹、過敏性搔癢等過敏現象。	可能造成嗜睡，不可飲酒，避免長途開車及操作危險器械。 飯前或飯後服用均可。建議用餐時服用。	昏睡、疲倦、口乾、頭痛。
87	Oxymetazoline HCl Nasal Spray 0.5mg/ml 10ml Sindecon Nasal Spray 0.5mg/ml"Standard" 醫鼻易噴鼻液	瓶	3	-	-	-	急性鼻炎、過敏性鼻炎、鼻竇炎。	暫時緩解因鼻炎、過敏性鼻炎、過敏或感冒引起之鼻塞、流鼻水症狀。	窄角性青光眼患者不建議使用。 高血壓、糖尿病、攝護腺肥大患者須謹慎使用。	頭痛、鼻腔內有燒灼感。
88	Epinephrine Inj 1mg/ml Epinephrine Injection "Vpp" 腎上腺素注射液	瓶	5	5	-	-	過敏反應引起之休克，呼吸道抽搐或喉頭水腫，心跳停止之急救，支氣管性氣喘。	過敏反應引起之休克、呼吸道痙攣或喉頭水腫、心跳停止之急救、支氣管性氣喘。	肌肉注射、皮下注射、靜脈注射。 作心臟注射或靜脈注射前應將此注射劑 0.5ml 用 NS 稀釋至 10ml。應避免臀部肌肉注射。	噁心、嘔吐、心悸、顫抖。

89	Atropine Sulfate Inj 1mg/ml Atropine Sulfate Inj "Sintong" 硫酸阿托品注射液	瓶	5	5	-	-	膽石症、幽門抽搐、胃酸過多、有機磷化物、毛果芸香鹼中毒、診斷用。	膽石症、幽門痙攣、胃酸過多、胃痙攣、有機磷化物、毛果芸香鹼中毒、診斷用散瞳、調節痙攣、乙醚等麻醉時之抑制支氣管分泌。	靜脈給藥時速度需緩慢。	視覺模糊、懼光、便秘、口乾。
90	Glucagon Inj 1mg Glucagon Inj 1mg 昇糖精	瓶	1	-	-	-	治療低血糖、用於消化道內視鏡檢及放射線顯影術、用於評估胰島β－細胞分泌功能。	治療上之適應症： GlucaGen是用於使用胰島素治療糖尿病之兒童及成人所致之嚴重低血糖。 診斷上之適應症： 用於成人消化道內視鏡檢及放射線顯影術。 用於評估胰島β－細胞分泌功能。	低血糖使用：採皮下或肌肉注射，通常病人在10分鐘內會有反應，若病人有反應，則給予口服碳水化合物，防止低血糖再度發生；若病人在10分鐘內沒有反應，請儘速就醫。 醫療診斷使用採靜脈注射。本品絕不可靜脈點滴輸注。 儲存於冰箱中(2°C-8°C)，不可冷凍。配製後溶液應立即使用。	噁心、嘔吐、腹痛、過敏反應。

91	Naloxone HCl Inj 0.4mg/ml Naloxone Inj "G.B.L." 0.4mg/ml 解麻注射液	瓶	10	-	-	-	麻醉藥品過量之解毒劑。	麻醉藥品過量之解毒劑。	本藥可經靜脈注射、肌肉注射或皮下注射投與。 以 NS，D5W 稀釋，在 500ml 溶液中加入 2mg，可產生 0.004mg/ml 之濃度，再由點滴靜脈注射。 稀釋之溶液應於 24 小時內使用完畢，剩餘量應丟棄。	低血壓、高血壓、心室心搏過速、呼吸困難、肺水腫。
92	Phytomenadione Inj 10mg/ml Phytonadione Injection 10mg "Tbc" 血納定注射液 10 毫克	瓶	10	-	-	-	出血之預防及治療。 維生素 K 吸收之障礙及缺乏	預防或治療新生兒維生素 K 缺乏性出血、預防或治療因維生素 K 缺乏或干擾導致之低凝血酶原症。	一般以肌肉或皮下注射為主。如在緊急時採用靜脈給藥，必須以 NS 或葡萄糖注射液稀釋後，緩慢靜脈輸注，輸注速率不可超過 1mg/min。 ※食藥署公告 phytonadione 靜脈注射劑型可能致嚴重過敏性反應(含休克)，輸注過快、對 Tween80 過敏等均可增加風險，且初次或再次投予時均可能發生。應確認過敏史，輸注中及輸注完成後密切監測。	注射部位紅腫疼痛、過敏性反應。
93	Tramadol/Acetaminophen 等複方 Tab 37.5/325mg Tramacet Tab 37.5/325mg ＜管 4＞妥美亭膜衣錠	錠	300	50	10	-	麻醉止痛劑	使用非鴉片類止痛劑無效之中度至嚴重性疼痛。	管制藥品 飯前或飯後服用均可。 請按醫師指示使用本藥，勿自行更改劑量。	頭昏、噁心、口乾、嘔吐、疲倦、便祕、偶有過敏反應。

94	Morphine HCl Inj 10mg/ml ＜管 1＞鹽酸嗎啡注射液	瓶	20	10	-	-	麻醉止痛劑。	鎮痛。	管制藥品 未用完之藥品如不再使用時應繳（寄）回醫院。 皮下或靜脈注射使用，若持續輸注則每小時0.8-35MG。	皮膚癢、過敏、便秘。
95	Codeine Phosphate Tab 30mg Codeine Phosphate Tab 30mg ＜管 2＞磷酸可待因錠 30 公絲	錠	100	100	-	-	止咳、止痛。	鎮咳、鎮痛。	管制藥品 服藥期間勿飲酒。 飯前或飯後服用均可。 未用完之藥品如不再使用時應繳（寄）回醫院。	頭昏，眩暈，思睡，噁心，嘔吐。
96	Alprazolam Tab 0.5mg Xanax Tab 0.5mg ＜管 4＞贊安諾錠	錠	200	50	-	-	精神安定劑。	焦慮狀態。	管制藥品 可能造成嗜睡，不可飲酒，避免長途開車及操作危險器械。 飯前或飯後服用均可。	想睡、頭痛、便祕。

備註：

一、 各漁船種類應配置藥品以「*」標記，並得以對應「適應症」之其他藥品取代；未標註「*」者為建議配置藥品。

二、 藥品商品名稱僅供參考。

三、 標註「管」字者為管制藥品，請依「管制藥品管理條例」相關規定辦理。

四、 A 行：適用於領有遠洋作業許可漁船最低藥品數量配置之準據，可依船員數調整準備數量。

B 行：適用於航行不超過七十二小時之近海作業漁船最低藥品數量配置之準據，可依船員數調整準備量。

C 行：適用於可在四小時內到達港口之沿岸作業漁船，其航行最低藥品數量配置之準據，可依船員數調整準備量。

D 行：適用於沿岸作業之舢舨漁筏準據(即基本款「家庭保健箱」，部分藥品不足時應隨時補充)。

二、器材種類

編號	設備名稱	單位	A 數量	B 數量	C 數量	D 數量	用途	備註
1	Cane, with rubber tip 單支拐杖	件	1*	1	-	-	腳部損傷	
2	Crutch, adjustable, wood, with rubber tip 可調木拐杖(橡膠頭)鋁製拐杖	對	1*	-	-	-	腳部損傷	
3	Eye cop, for eye irrigation 沖洗眼睛用眼罩	件	2*	1	1	-	沖洗眼睛	
4	Heating-pad, electric, waterproof, AC/DC 防水取暖電毯	件	1*	1	-	-	保暖用	
5	Hot-water/ice bag, rubber, stopperless type 冰熱兩用橡膠敷袋	件	1*	1	1	1	用於減少腫脹、止痛及降温	
6	Magnifying glass (8 loupe) 放大鏡	件	1*	1	-	-	手術醫療用	
7	Urinal, male	件	2*	1	-	-	能自行控制排尿臥床男病人適用	

	男用尿壺							
8	Cuffs, leather or cloth 手部約束帶	件	2*	1	-	-	約束患者手部	
9	Mummy restraint (whole-body restraint) 全身約束帶	件	1*	1	-	-	約束患者全身	
10	Scales, adult, weighing, clinical, capacity 150 kg 體重計	件	1*	-	-	-	量測體重	
11	Sphygmomanometer, aneroid, 300-mm Hg scale,hand type, complete in case 無液血壓計	件	1*	1*	1	-	量測血壓	
12	Pulse Oximeter 血氧機	件	2*	1	-	-	量測人體血氧飽和濃度及心跳	
13	Thermometer 體溫計	件	1*	1*	1	1	量測額溫	
14	Splints, inflatable, arm, for above/ below elbow, assorted sizes, 6s 手臂骨折固定板(鋁製)	包	1*	1*	1	-	手臂骨折固定用	
15	Splints, inflatable, leg, for above/ below knee, assorted sizes, 5s	包	1*	1*	1	-	腿部骨折固定用	

	腿部骨折固定板(鋁製)							
16	Splints, finger, aluminum, padded, assorted sizes 6s 手指骨折固定板(鋁製)	包	1*	1*	1	-	手指骨折固定用	
17	International medical guide for ships (newest edition) 國際船舶醫療指南(最新版)	件	1*	1	1	-	提供船舶醫療之建議方法	
18	Forceps, dressing, bayonet-shaped, Adson, 18cm 鑷子	件	1*	1*	1	1	夾棉花球或異物	
19	Handle, knife (scalpel), No. 4 4 號手術刀	件	2*	1	-	-	切開傷口用	用於可拆卸手術刀片
20	Scissors, surgical straight, 15 cm 剪刀	件	2*	1	1	1	裁剪紗布或繃帶	
21	Needle-holder, suture, Hegar-Mayo, 14 cm 持針器	件	2*	1	-	-	夾持縫針縫合各種組織	用於縫合傷口
22	Adhesive tape, surgical 膠帶 (a) 5 cm x 5 m (b) 2 cm x 5 m	捲	 6* 6*	 3 3	 1 1	--	用作固定敷料、繃帶、紗布	

23	Applicators, wood, cotton-tipped ends, sterile, 2mm x 15 cm, 50s 棉花棒（塗藥器）	包	3*	2*	1	-	傷口處理	
24	Bandage, cotton, elastic, rubberless, 12s 繃帶 (a) 10 cm x 5 m roll (b) 8 cm x 5 m roll (c) 5 cm x 5 m roll	盒	 1* 1* 1	 0 1* 1	 0 1 1	---	固定用	
25	Bandage, gauze, roller, sterile 3 cm x 10 m, two-ply, clinging, 2 safety-pins, 12s 紗布繃帶（6 切）2 支/組+安全別針 2 支	包	1*	1	1	-	固定用	彈性紗布繃帶
26	Casualty dressing, adhesive, individually wrapped, sterile 傷口敷料（人工皮）(a) 9 cm x 6 cm (b) 18 cm x 9 cm	件	 30* 20*	 15 10	 10 5	--	傷口處理	單獨包裝
27	Petrolatum-gauze burn-and-wound dressing, various sizes, individually packed, sterile 凡士林紗布燒傷敷料	件	20*	10	5	-	燒燙傷傷口處理	

28	Gauze bandage, tubular, 2 cm by 5 cm, rolled, with applicator 紗布繃帶	件	5*	2	1	1	包紮傷口	
29	Mortuary transfer bag, leakproof 屍袋	件	2*	1	-	-	存放大體	
30	Pad, cotton, eye, sterile, individually sealed, 12s 滅菌眼罩	包	1*	1	1	-	保護眼睛傷口或吸收分泌物之用	
31	Pad, non-adherent sterile dressing, non-woven cotton and rayon fabric with perforated plastic cover, individually sealed, 8 cm x 10 3M 不沾粘紗布塊（大）	件	100*	50	20	-	止血、防止感染	傷口乾燥敷料
32	Safety-pin, rustless 安全別針	件	100*	50	20	-	扣緊繃帶	各種尺寸
33	Skin closure, adhesive, surgical, sterile(butterfly closure), 6 mm, 25s 皮膚黏劑(免縫膠帶)	包	2*	1	1	-	傷口癒合	在可行之情況下代替傷口之縫合
34	Skin closure, adhesive, sutureless sterile, 10 cmx 8 cm 雅膚傷口敷料（大）綠色	件	10*	5	-	-	傷口癒合	
35	Suture, armed, 1/2 circle, 25-mm, non-traumatic needle, non-	包	1*	-	-	-	傷口縫合	

	absorbable, silk, braided, 45 cm long, size OOO, sterile, individually sealed 12s 滅菌手術針線 3-0							
36	Suture, armed, 3/3 circle, 20-mm needle, size OOO, sterile: absorbable, individually sealed, 12s 滅菌手術針線 3-0	包	2*	1	-	-	傷口縫合	
37	Suture, armed, non-absorbable, polyester, 3/8 circle, 13-mm needle with non-traumatic point, size 5-O, sterile, sealed, 12s 滅菌手術針線 3-0	包	1*	-	-	-	傷口縫合	
38	Suture, tapered, 1/2 circle, 70 cm long, size OO, sterile, individually sealed, 12s 滅菌手術針線 2-0	包	1*	-	-	-	傷口縫合	
39	Suture removal kit. Containing: suture- removing forceps, sterile, and suture removal scissors, sterile 手術針線移除組	套	1*	-	-	-	拆線用	

40	Test strip and dolour chart, combined (urinary blood, glucose, ketone, protein, bilirt.bin, and pH), 100s 5 種尿液試紙	瓶	1*	1	-	-	尿液檢測	
41	One touch glucose Test kit, 含檢測針頭	套	1*	1	1	-	指尖血糖機	
42	Petrolatum, white, 60g tube 白色凡士林	件	6*	2	2	1	潤滑、手腳裂痕、皮膚粗糙等皮膚保護	
43	Basin, emesis, kidney shape 腎形碗	件	1	1	-	-	收集液體、供應商、儀器、弄髒之敷料、醫療廢物、切除樣本	
44	Basin, wash, with rimu 有邊洗臉盆	件	1	1	-	-	清洗、清潔用	
45	Bedpan 便盆	件	1	1	-	-	行動不便傷患排便用	
46	Funnel, metal 12cm diameter 金屬製漏斗	件	1	1	1	-	分液、加料用	
47	Glass cylinder, 50 cm3, graduated 玻璃圓管(50 cm3)	件	1	1	1	-	用於測量液體容量	
48	Glass cylinder, 500 cm3, graduated 玻璃圓管(500 cm3)	件	1	1	1	-	用於測量液體容量	

49	Oxygen unit, portable, with size E oxygen cylinder, adult face mask, regulator, tubing: wrench, instruction books (all in sell-contained carrying case) 攜帶式氧氣組	件	1	1	1	-	呼吸道急救	
50	Spare oxygen cylinder, size E, for item 15 (filled with oxygen) 備用氧氣瓶	件	1	1	-	-	呼吸道急救	
51	Refrigerator, about 60-litre capacity, with inside thermometer, cyclamatic automatic defrosting, to operate on a ship's electrical current, and litted with a lock 冰箱。容量約 60 公升，附有內部溫度計、循環自動除霜、利用船舶電流操作及帶鎖照明	件	1	1	-	-	保存醫療用品	
52	Resuscitator, hand-operated, with excess pressure relief device, inlet check valve with nipple for optional connection to low-pressure oxygen line 人工復甦器	件	1	1	1	-	人工呼吸及心肺復甦	
53	Rubber inflatable ring-pad	件	1	-	-	-	抗褥瘡墊，減輕疼痛	

	橡膠充氣環墊							
54	Stethoscope, disc-diaphragm type 聽診器	件	1	1	1	-	醫療診察用	
55	Thermometer, bath 水浴温度計	件	2	1	-	-	量測水溫	
56	Tray, with cover, for sterilization of small instruments 有蓋托盤	件	1	-	-	-	放置醫療用具	作為滅菌器組件：必須安裝在滅菌器隔間內
57	Oral & Nasal Airway pharyngeal, plastic, adult and child sizes 口鼻咽呼吸通道（大人+小孩）	件	2	1	1	-	維持患者呼吸道暢通	
58	Forceps, hemostat, curved, Halstead,mosquito, 15 cm 止血鉗	件	2	-	-	-	夾緊小血管並在切口較淺時用於精細組織解剖	
59	Adhesive bandage　OK 蹦	包	-	-	-	1	小傷口使用	
60	Administration set, intravenous, with butterfly hub needle, 1 mm x 40 mm, sterile, disposable 輸液器（含頭皮針）	件	6	1	-	-	靜脈輸液	從供應靜脈輸液製造商採購
61	Bandage, absorbent, adhesive, 5 cm x 5 m, 100s　2 吋自粘性彈繃帶	盒	2	1	1	1	固定用	附黏合劑之吸水繃帶
62	Bandage, gauze, roller, sterile 繃帶 (a) 10 cm by 5 m	件	60 40	30 20	30 10	--	固定用	單獨包裝

	(b) 12 cm by 5							
63	Breathable tape 透氣膠布	捲	-	-	-	1	固定傷口處之紗布	
64	Bandage, muslin, triangular, folded, with 2 safety-pins, 90 x 180 cm 三角巾+安全別針/2 支繃帶	件	4	2	1	1	包紮或固定傷口	
65	Tube-gauze-type bandage for finger 手指用紗布型繃帶	件	10	5	2	-	手指傷口處理	
66	Spray dressing, 120 ml 膚諾痛噴的敷料	瓶	4	2	1	-	清潔及消毒傷口	
67	First aid emergency dressing 急救敷料(a)small size (b)Medium size (c)Large size	件	10 20 20	10 10 10	5 10 5	---	傷口處理	
68	Collar, cervical, with strap 頸圈	件	1	-	-	-	使頸椎固定或手術後維持頸椎復位後之固定，促進骨骼癒合	
69	Cotton sticks 棉枝(有長柄)	包	10	5	5	1	清洗傷口或消毒	
70	Gowns, surgical 外科手套	件	5	-	-	-	處理傷口	

71	Needle, hypodermic 0.5 mm x 16 mm, sterile,6s 27 號 皮下注射針頭	包	6	1	-	-	注射藥劑用	
72	Needle, intramuscular injection, 1 mm, 5 cm, 6s21 號 肌肉針頭	包	3	1	-	-	注射藥劑用	
73	Needle, intramuscular injection, 1.1 mm, 3 cm, 6s19 號 肌肉針頭	包	2	1	-	-	注射藥劑用	
74	Occult blood detection tablet, with 60 filter papers, 60s 潛血檢測片(附 60 張濾紙)	包	1	-	-	-	潛血檢測	
75	Sheet, waterproof, 110 cm x 180 cm 防水薄片(超薄型多愛膚敷料 10*10 187955A)	件	2	1	1	-	傷口癒合	
76	Syringe, glass 玻璃注射針筒 (a) 2 ml (b) 5 ml (c) 20 ml	件	4 4 2	2 2 1	---	---	注射藥劑	

77	Syringe, plastic, disposable, sterile. Individually sealed, with injection needle: 塑膠注射器(2cc、5cc 空針) (a) 2 ml, with intramuscular needle.1 mm,5cm (b) 5 ml, with intramuscular needle. 1 mm, 5cm	件	50 30	25 25	--	--	注射藥劑	
78	Test tablets, kit, glucose (reducing sugar) in urine, individually sealed, 36s 尿糖試紙	包	3	-	-	-	糖尿檢測	
79	Tourniquet, non-oneumatic, blood-taking type, composed of gum rubber with Velcro-typeFastener 止血帶	件	1	1	1	-	止血用	
80	Towel, paper, sterile, disposable, individuallywrapped, 12s 拋棄式紙毛巾(治療巾)	包	2	1	-	-	清潔用	
81	Talc (talcum powder), 120 g 痱子粉	罐	6	3	3	-		
82	Alcohol Wipes 酒精棉片	包	-	-	-	1	消毒傷口或器具	

備註：

一、各漁船種類應配置器材以「*」標記，並得以對應「用途」之其他器材取代；未標註「*」者為建議配置器材。

二、A 行：適用於領有遠洋作業許可漁船最低器材數量配置之準據，可依船員數調整準備數量。

B 行：適用於航行不超過七十二小時之近海作業漁船最低器材數量配置之準據，可依船員數調整準備量。

C 行：適用於可在四小時內到達港口之沿岸作業漁船，其航行最低器材數量配置之準據，可依船員數調整準備量。

D 行：適用於沿岸作業之舢舨漁筏準據(即基本款「家庭保健箱」，部分器材不足時應隨時補充)。